

ENTER
SHOP


Canadian
Pharmacy



- Top Quality Medications
- No Prescription Required
- Secure Payment
- Worldwide Shipping
- 24/7 Customer Support


TOP RATED
BY PHARMACYCHECKER


CIPA
CERTIFICATION


PGEU GPUE
PHARMACEUTICAL
GROUP OF THE EUROPEAN UNION

[Köpa Viagra på nätet](#)

Köp generisk Viagra online receptfritt Sverige

Bland medelålders och äldre män, särskilt de som lider av impotens, är användningen av Viagra-tabletter oundgänglig. Men trots det faktum att uppfinningen av Viagra gav människor som led av impotens ett effektivt sätt att känna sig komplett.

Den berömda Viagra innehåller den aktiva ingrediensen Sildenafil. Läkemedlet tillverkas i tabletter med tre doser - 25 mg, 50 mg och 100 mg.

Viagra verkar i kroppen genom en komplex kedja av biokemiska reaktioner. Som ett resultat leder de till avslappning av muskelväggarna i kärlen i de kavernösa kropparna i penis och deras fyllning med blod. Detta säkerställer ett naturligt svar på sexuell upphetsning.

Det är viktigt att förstå att Viagra inte behandlar orsaken till erektil dysfunktion (ED), det hjälper helt enkelt att hantera konsekvenserna. Viagra ökar inte sexlusten. Om det inte finns någon attraktion till partnern är medicinen värdelös.

Tillkomsten av Viagra förändrade livet för miljontals män runt om i världen. Tack vare det återgår patienter med erektil dysfunktion till ett normalt sexliv.

Trots sin höga effektivitet leder vissa patienter som tar läkemedlet inte till en förbättring av erektionen. Detta beror på felaktig användning av medicin eller det faktum att ED helt enkelt är en följd av en annan sjukdom. I sådana fall är konsultation och undersökning av läkare obligatoriskt.

Ofta förklaras ineffektiviteten av Viagra av dess felaktiga användning. Stress komplicerar också behandlingen av ED. Dessutom, att äta en tung måltid innan du tar Viagra saktar upp absorptionen av läkemedlet och främjar blodflödet till tarmarna snarare än penis. Viagra ska tas cirka 1 timme före förväntat samlag, helst på fastande mage. Jag rekommenderar att patienter inte äter eller dricker under 1 timme före och 1 timme efter att de tagit Viagra.

Viagra är kontraindicerat hos patienter:

- ta emot terapi med nitratläkemedel för hjärtsjukdomar;
- vid allvarliga leversjukdomar;
- i allvarliga fall av hjärtsvikt, hjärtinfarkt, stroke, arytm;
- om blodtrycksmätningarna är för höga eller för låga;
- för sjukdomar i synnerven;
- vid överkänslighet mot sildenafil och komponenter i läkemedlet;
- upp till 18 år;

Att ta läkemedlet är säkert om du följer instruktionerna och konsulterar din läkare först. Alla mediciner som tas regelbundet ska rapporteras. Ett antal läkemedel är oförenliga med Viagra.

Impotens är inte en dödlig sjukdom. Innan du tar någon medicin, se till att rådfråga din läkare för att undvika eventuella biverkningar från medicinen.